



## **Raccolta per TAMPONE FARINGEO**

### **CONDIZIONI PRELIMINARI**

- Sospendere la terapia antibiotica per circa 3-4 giorni precedenti l'esame.
- Presentarsi a digiuno, senza aver lavato i denti o usato colluttori orali.

### **CONTENITORE PER LA RACCOLTA:**

Tampone sterile con terreno di trasporto

### **MODALITA' DI RACCOLTA :**

- Piegare la testa all'indietro e aprire bene la bocca;
- rivolgere il paziente verso una sorgente appropriata di illuminazione, per visualizzare la sede ove operare il prelievo
- se necessario, usare un abbassalingua sterile e premere delicatamente la lingua;
- inserire il tampone tra i pilastri tonsillari e dietro l'ugola e strofinare le zone tonsillari e qualsiasi sede con segno di flogosi;
- evitare il contatto del tampone con la lingua, le guance, il velopendolo, le arcate dentarie e le pareti laterali del cavo orale
- evitare che il tampone si contamini con la saliva.
- riporre il tampone nel contenitore con il terreno di trasporto

### **CONSERVAZIONE E TRASPORTO**

Il campione deve essere prelevato in sede ambulatoriale e consegnato al laboratorio entro 2 ore ma può essere conservato per un massimo di 24 ore a temperatura ambiente

### **CRITERI DI NON ACCETTAZIONE :**

Non vengono accettati campioni pervenuti in contenitore :

- non sterile
- non integro
- non perfettamente chiuso con fuoriuscita di materiale