



Unità funzionale di Videoendoscopia Digestiva
Servizio di Ecoendoscopia Diagnostica e Operativa

Responsabile: Dott. Michele Golia

850.16.17.04_ENDO_

PREPARAZIONE PER ECOENDOSCOPIA DELL'APPARATO DIGERENTE INFERIORE

1. IMPEGNATIVA

Per l'esecuzione dell'esame e, in base alle disposizioni amministrative della Regione, bisogna presentarsi muniti di impegnativa con le seguenti diciture, a seconda della procedura indicata:

- Ecoendoscopia dell'apparato digerente inferiore (retto,colon).*

In caso di necessità di biopsia le diciture dell'impegnativa saranno da modificare come di seguito:

- Ecoendoscopia dell'apparato digerente inferiore (retto,colon) con biopsia.*

In caso di necessità di ricovero, l'impegnativa per lo stesso sarà predisposta dal Medico Operatore o da altro Medico del Policlinico di Monza per i pazienti residenti in regione Lombardia.

Per i pazienti provenienti da altra Regione, l'impegnativa per ricovero (Day Surgery oppure Ordinario) deve essere predisposta dal Medico Curante



Unità funzionale di Videoendoscopia Digestiva Servizio di Ecoendoscopia Diagnostica e Operativa

Responsabile: Dott. Michele Golia

850.16.17.04_ENDO_

2. PREPARAZIONE

- E' possibile comunque **assumere le terapie farmacologiche già in corso**.
 - E' necessario, qualora non sia già stato segnalato in sede di prenotazione esame, dichiarare la presenza di **ALLERGIA AL LATTICE** per una corretta programmazione dello stesso.
- I pazienti candidati a biopsia sotto guida ecoendoscopica in **terapia con antiaggreganti** (Aspirina, ticlopidina, Ibustrin, etc,) devono sospendere l'assunzione di questi farmaci almeno 7 gg prima dell'esame; chi è in terapia anticoagulante (Coumadin, Sintrom, Plavix, etc.) dovrà sospendere l'assunzione del farmaco, sostituendolo con iniezioni di eparina sottocute secondo i consigli del Centro TAO di riferimento o del proprio Specialista.
- Portare sempre con sé la **documentazione sanitaria** (radiografie del clisma opaco, tubo digerente, ecografie, referti endoscopici, terapie in corso, etc.).

E' necessario essere **accompagnati da una persona** in quanto potrebbe essere praticata un'iniezione sedativa; è consigliata l'esecuzione di una doccia igienizzante il giorno dell'esame e presentarsi allo stesso con abbigliamento comodo.

Prodotto farmacologico occorrente

Una confezione di **MOVIPREP** contiene 2 buste trasparenti; in ognuna di queste buste si trovano una busta grande A ed una bustina piccola B. Un litro di "soluzione" si prepara mescolando insieme una busta A e una bustina B in 1 litro di acqua fino a completo scioglimento (soluzione limpida). Ogni litro di soluzione deve essere bevuto nell'arco di 1 ora (un bicchiere pieno ogni 10-15 minuti). La preparazione comporta l'assunzione di 1 litro di soluzione seguito, **OBBLIGATORIAMENTE**, da 1 litro di altri liquidi limpidi (acqua, tè, camomilla, brodo di dado).

ATTENZIONE: MOVIPREP è controindicato nei pazienti affetti da fenilchetonuria e nei pazienti con carenza di glucosio-6-fosfatasi (favismo). Se risulta impossibile completare la preparazione, o in caso di controindicazione si prega di contattare il proprio Medico Curante o di telefonare ai seguenti numeri:

• Servizio di Endoscopia Digestiva (Lun-Ven 08.30-16.30)





**Policlinico
di Monza**

Istituto di Ricovero e Cura ad Alta Specializzazione

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

Unità funzionale di Videoendoscopia Digestiva
Servizio di Ecoendoscopia Diagnostica e Operativa

Responsabile: Dott. Michele Golia

850.16.17.04_ENDO_

Medico Responsabile

039/2810.377

Caposala

039/2810.309



Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.A.
20900 Monza via Amati, 111
tel +39 039 28101 - fax +39 039 2810470
info@policlinicodimonza.it

Istituto Clinico Universitario di Verano Brianza
20843 Verano Brianza Via Petrarca, 51
tel. +39 0362 8241
fax +39 0362 824400

DIREZIONE SANITARIA
Direttore Sanitario
Dott. Alfredo Lamastra



Policlinico di Monza
Gruppo Sanitario



Unità funzionale di Videoendoscopia Digestiva Servizio di Ecoendoscopia Diagnostica e Operativa

Responsabile: Dott. Michele Golia

850.16.17.04_ENDO_

Due giorni prima dell'esame

- **Alimenti permessi** : uova, formaggio, pasta, semolino, pane bianco, burro o margarina, biscotti e fette biscottate non integrali e senza cereali, crackers non integrali, patate senza buccia, banane.
- Non sono permessi : carne, pesce, frutta, verdura, cereali in qualsiasi forma. Si raccomanda di **bere molti liquidi limpidi** (acqua, tè, camomilla, brodo di dado).
- In caso di stitichezza grave la dieta deve iniziare 3 giorni prima dell'esame.

Il giorno prima dell'esame

Esame al mattino (entro le ore 13:00)	Esame al pomeriggio
A colazione: caffè, tè, miele, zucchero, biscotti e fette biscottate (non integrali)	A colazione: caffè, tè, miele, zucchero, biscotti e fette biscottate (non integrali)
A pranzo: semolino o brodo di dado, pastina, uno yogurt (senza frutta in pezzi o cereali)	A pranzo: semolino o brodo di dado, pastina, uno yogurt (senza frutta in pezzi o cereali)
Dalle ore 18:30 alle ore 19:30: bere 1 litro di soluzione (un bicchiere ogni 10-15 minuti) e successivamente mezzo litro di liquidi limpidi (acqua, tè, camomilla, brodo di dado)	A cena: solo brodo di dado o tè zuccherato
A cena: solo brodo di dado o tè zuccherato	



Unità funzionale di Videoendoscopia Digestiva
Servizio di Ecoendoscopia Diagnostica e Operativa

Responsabile: Dott. Michele Golia

850.16.17.04_ENDO_

Il giorno dell'esame

Esame al mattino (entro le ore 13:00)	Esame al pomeriggio
<p>Al risveglio: presentarsi in Ospedale a digiuno. E' possibile eventualmente bere acqua non gassata, tè, camomilla con zucchero fino a 3 ore prima dell'esame.</p> <p>Controllare che le evacuazioni siano alla fine di liquido chiaro senza materiale fecale.</p> <p>Se così non fosse, eseguire un clistere Clisma Fleet o un clistere tradizionale a bassa pressione (sdraiati sul fianco sinistro e boccia del clistere a non più di 50 - 70 cm dal piano del letto)</p>	<p>Dalle ore 7:00 alle ore 8:00: bere 1 litro di soluzione (un bicchiere ogni 10-15 minuti) e successivamente mezzo litro di liquidi limpidi (acqua, tè, camomilla).</p> <p>Non pranzare. E' possibile bere acqua, tè, camomilla con zucchero fino a 3 ore prima dell'esame.</p> <p>Controllare che le evacuazioni siano alla fine di liquido chiaro senza materiale fecale. Se così non fosse eseguire un clistere Clisma Fleet o un clistere tradizionale a bassa pressione (sdraiati sul fianco sinistro e boccia del clistere a non più di 50 - 70 cm dal piano del letto)</p>