



LABORATORIO ANALISI

MO851.01.07.04

Modalita' di raccolta campioni biologici

ESAME COLTURALE DELL'ESCREATO

CONDIZIONI PRELIMINARI

1. E' opportuno effettuare la raccolta del campione al mattino al risveglio e a digiuno (è più facile raccogliere l'espessorato al mattino poiché durante la notte vi è un accumulo delle secrezioni respiratorie).
2. **NON** sono accettabili campioni raccolti a più riprese o raccolti durante la notte e consegnati il giorno successivo.

ESAME MICROBIOLOGICO RICERCA GERMI COMUNI

CONTENITORE PER LA RACCOLTA:

Il materiale deve pervenire in un contenitore di plastica sterile con il tappo a vite, a bocca larga acquistabile in farmacia.

MODALITA' DI RACCOLTA :

- rimuovere eventuali protesi dentarie, procedere ad una accurata pulizia del cavo orale, risciacquando ripetutamente la bocca ed effettuando dei gargarismi con acqua
- raccogliere l'espessorato dopo uno o più colpi di tosse direttamente nel contenitore sterile, tenendolo adeso al labbro inferiore, chiudere bene il contenitore avvitando il tappo. La quantità di espessorato deve essere di almeno 2-3 ml.

Per i pazienti che hanno difficoltà ad espessorare:

- eseguire il lavaggio della mucosa orale con acqua
- provocare la tosse e l'espessorazione dopo aerosol con Soluzione fisiologica (cloruro di sodio al 10%)
- raccogliere l'escreato come sopra.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il campione deve essere prelevato e consegnato al laboratorio entro 2 ore. Se il tempo previsto per la consegna al laboratorio è superiore alle due ore, conservare il campione in frigorifero fino alla consegna.

ESAME MICROBIOLOGICO RICERCA MICOBATTERI

Per la raccolta, conservazione e trasporto del campione biologico rifarsi alle istruzioni sopra descritte.

Per la diagnosi di infezione tubercolare sono consigliati 3 campioni raccolti in mattine successive.

CRITERI DI NON ACCETTAZIONE :

Non vengono accettati campioni pervenuti in contenitore :

- non sterile
- non integro
- non perfettamente chiuso con fuoriuscita di materiale (non sono più garantite le condizioni di sterilità)
- contenenti materiale non idoneo (rappresentato da prevalenza di saliva).