



DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
SCHEMA DI PREPARAZIONE PER:

TAC ADDOME (con e senza contrasto) PER STUDIO MIRATO DEL COLON
UTILIZZO TECNICA DI COLONSCOPIA VIRTUALE.

Presentarsi muniti di impegnativa riportante la seguente dicitura:

- TAC addome per studio mirato del colon (con e senza contrasto se segnalato dal prescrittore).
Utilizzo tecnica di colonscopia virtuale.

Ove segnalato dal prescrittore MDC, il paziente dovrà anche essere munito di esiti (da ritenersi validi entro 1 mese dall'esecuzione) di: CREATININEMIA*.

- Nei tre giorni precedenti l'esame è consigliabile una dieta povera di scorie, astenendosi dall'ingerire verdure crude, legumi (fagioli, piselli, ecc.) e frutta (uva, kiwi, anguria, fichi).
- Nel caso che l'esame venga effettuato nel pomeriggio, è consentita l'assunzione di una leggera colazione entro le ore 8.00; mantenere poi il digiuno.
- E' possibile comunque assumere le terapie farmacologiche già in corso.

Prodotto farmacologico occorrente: (in farmacia)

- Una confezione di **Selg 1000-ESSE** da quattro buste, per la preparazione di 4 litri di soluzione.

Preparazione per il giorno precedente l'esame:

- Iniziare la preparazione a partire dalla ore 12.00 in poi.
- Versare il contenuto di una busta in un litro di acqua fresca (senza aggiungere ghiaccio, zucchero, aromatizzanti vari o liquidi diversi dall'acqua) e agitare bene finchè la polvere non si è sciolta completamente. Ripetere la stessa operazione con ogni bustina.
- Bere rapidamente 250 ml di soluzione (un bicchiere da un quarto di litro) ogni 10-15 minuti sino ad assumere 4 litri totali (l'assunzione richiede in totale 3-4 ore).
- La somministrazione del prodotto darà luogo ad una diarrea importante priva di sintomi dolorosi, che al termine sarà costituita essenzialmente da acqua limpida.
- Lo stimolo all'evacuazione si manifesterà normalmente dopo un'ora e 30 circa dall'inizio dell'assunzione.
- Non ingerire alcun cibo né prima (3-4 ore) né durante, né dopo la preparazione.
- La cena sarà costituita esclusivamente da liquidi (brodo, thè, camomilla, acqua, succhi di frutta).

Preparazione per il giorno dell'esame:

- Osservare il digiuno dalla mezzanotte ed eseguire 2 ore prima dell'esame un clistere di **Clisma LAX (in farmacia)** già pronto.
- Portare documentazioni (radiografie del clisma opaco, tubo digerente, ecografie, referti endoscopici, terapie in corso, ecc.) + 2 bottiglie di acqua minerale da 1/2 litro.

N.B.: L'esame consiste nell'introduzione di una sonda rettale (lunga circa 10 cm) e successiva sovradistensione del colon mediante insufflazione di aria, previa ipotonizzazione con Buscopan (miorilassante dell'intestino). Presentarsi 1 ora prima dell'esame.

***Qualora non fossero intervenuti recenti alterazioni della funzionalità renale.**